


ROSA RUBIGINOSA

(*Triflora;* voyez ci-après, *var.* α.).

LE ROSIER ROUILLÉ, A TROIS FLEURS.

DESCRIPTION.

Ce Rosier, très-commun dans les haies et dans les buissons, s'élève à la hauteur de cinq à six pieds; ses tiges sont munies d'aiguillons nombreux, crochus et inégaux. Les folioles, au nombre de cinq à sept, rudes au toucher, sont couvertes dans leur surface postérieure et en leurs bords, de poils glanduleux, visqueux, souvent roussâtres, exhalant, sur-tout lorsqu'on les froisse dans les doigts, une odeur vineuse assez agréable. Les fleurs, réunies par deux, trois, ou cinq, à l'extrémité des rameaux, sont supportées par des pédoncules hispides. Le tube des calices est ovoïde et glabre; les styles sont velus et peu saillants, enfin les stygmates se réunissent en une tête convexe au centre de la fleur.

Description spécifique et Nomenclature des variétes de ce Rosier.

R. RUBIGINOSA.

R. *Germinibus ovatis globosis-ve; foliolis subrotundis supra pubescentibus subtus margineque glanduloso-villosulis; petiolis glandulosis cauleque aculeatis; aculeis substipularibus.* (N.)

* *Tubes des calices et pédoncules hispides.*

α. R. *Rubiginosa vulgaris.* WILLD. *En. Plant. Ber.* 1, *pag.* 156, *var.* α.
R. *Rubiginosa* L. *mant.* 564. THUILLIER, Fl. de Paris, ed. 2, p. 250.
R. *Rubiginosa hirta.* DESV. Journ. Bot. 1813, p. 118, var. η.
R. (*Eglanteria*). ROESS. Tab. 10. Pédoncules le plus souvent uniflores. Vulg. *Eglantier rouge, Eglantier à odeur de pomme de reinette.*
β. R. *Rubiginosa olivina.* DESV. *l. c.* var. ε. Tube petit, oliviforme.
γ. R. *Rubiginosa Cretica.* R. (*Cretica*) *montana foliis subrotundis glutinosis et villosis.* TOURNEF. *coroll.* 53. *An Rubiginosa sphærocarpa?* DESV. *l. c.* p. 117, var. γ. Croît dans les îles de la Grèce. L'individu de M. DESV. se trouve sur les Alpes.